

Chapter Review

- Mass is conserved in physical changes (dissolving salt in water, tearing paper) and in chemical changes. Activity 9.2: vinegar + baking soda gives carbon dioxide and other substances; in an open flask the reading drops because the gas escapes, but with a balloon fixed to the flask (closed system) the readings before and after are equal. Activity 9.3: sodium sulfate + barium chloride gives a white precipitate of barium sulfate and sodium chloride, and the total mass stays the same.
- Law of Conservation of Mass (Antoine Lavoisier, 1789): matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction; total mass of reactants = total mass of products. Example 9.1: $4.0 \text{ g CaCO}_3 + 2.92 \text{ g HCl} = 6.92 \text{ g}$; products $1.76 + 0.72 + 4.44 = 6.92 \text{ g}$; law obeyed. Example 9.2: $12 \text{ g C} + 32 \text{ g O}$ gives 44 g CO_2 ; so 2.4 g C gives $(44/12) \times 2.4 = 8.8 \text{ g CO}_2$.
- Law of Constant (Definite) Proportions (Joseph Proust): a compound always contains the same elements combined in a fixed ratio by mass, whatever its source. Water: hydrogen : oxygen = 1 : 8 by mass (9 g water gives 1 g H and 8 g O). Cinnabar: mercury 86.22 % and sulfur 13.78 %. Example 9.3: NaCl has Na : Cl = 23 : 35.5, so 46 g Na needs $(35.5/23) \times 46 = 71 \text{ g Cl}$. The law holds for compounds, not for mixtures.
- Dalton's atomic theory (postulates): all matter is made of tiny atoms; atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction; atoms of an element are identical in mass and properties; atoms of different elements differ; atoms combine in simple whole-number ratios to form compounds; the relative number and kind of atoms in a compound are constant. It explains both laws. (Later, isotopes and subatomic particles modified some postulates.)

- A molecule is an electrically neutral entity of more than one atom that can exist independently and shows the properties of the substance (H_2 , Cl_2 , O_2 , HCl , H_2O). Some elements like helium exist as single atoms. Atoms combine to reach a stable octet (duplet for hydrogen) by sharing or transferring electrons; the force holding them is a chemical bond. Combining lowers the energy of the system.
- Covalent bond: formed by sharing of electrons. H_2 : each H shares 1 electron, single bond H-H. Cl_2 : single bond Cl-Cl. O_2 : each O shares 2 electrons, double bond $O=O$. HCl : H and Cl share one pair, H-Cl. H_2O : oxygen shares one electron with each of two hydrogens. Covalent compounds are named with prefixes mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-: CO carbon monoxide, CO_2 carbon dioxide, CS_2 carbon disulfide, PCl_3 phosphorus trichloride, SF_6 sulfur hexafluoride, N_2O_4 dinitrogen tetroxide, N_2O_5 dinitrogen pentoxide. No prefix before hydrogen (H_2S hydrogen sulfide). Water and ammonia (NH_3) keep common names.
- Ionic bond: formed by transfer of electrons. Atom with fewer than 4 valence electrons loses them to form a cation; atom with more than 4 gains electrons to form an anion. Na (2,8,1) loses 1 electron to form Na^+ (11 protons, 10 electrons); Cl (2,8,7) gains 1 to form Cl^- . The electrostatic force of attraction between opposite ions is the ionic bond ($NaCl$). Ionic compounds form 3-D crystal lattices (each Na^+ surrounded by six Cl^-). Mg gives Mg^{2+} , S gains 2 electrons as S^{2-} . Metals form cations, non-metals form anions. Name: cation first, then anion ending in -ide (sodium chloride, calcium oxide, magnesium sulfide); polyatomic ions usually do not end in -ide.

- Writing formulae by criss-cross of valencies/charges: write cation first, cross over the numbers, simplify by a common factor, use brackets when 2 or more polyatomic ions are present. Examples: HCl , H_2S , CCl_4 (covalent); CaCl_2 , Al_2O_3 , MgO (not Mg_2O_2), CaCO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$ (not AlOH_3), $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Common ions: Na^+ , Li^+ , K^+ , Ag^+ , Cu^+ , NH_4^+ , OH^- , NO_3^- , HCO_3^- , F^- , Cl^- , Br^- , I^- (valency 1); Ca^{2+} , Ba^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} , O^{2-} , S^{2-} , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} (2); Fe^{3+} , Al^{3+} (3).
- Properties: ionic compounds (NaCl , CuSO_4) dissolve in water but not in kerosene or petrol; do not conduct in solid state (ions fixed) but conduct when dissolved in water or molten (ions free); high melting and boiling points. Covalent compounds (camphor, naphthalene) are insoluble in water, soluble in kerosene and petrol, generally non-conductors, low melting and boiling points; sugar dissolves in water but forms no ions, so no conduction.
- Molecular mass of a covalent compound = sum of atomic masses ($\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ u}$, $\text{CO}_2 = 44 \text{ u}$). Ionic compounds do not form molecules; use formula unit mass: $\text{Na}_2\text{O} = 62 \text{ u}$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 = 164 \text{ u}$. Atomic masses used: H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Mg 24, P 31, Cl 35.5, K 39, Ca 40.

Key Terms

Law of conservation of mass – Mass of reactants = mass of products (Lavoisier).

Law of constant proportions – Fixed mass ratio of elements in a compound (Proust).

Molecule – Neutral group of atoms able to exist independently.

Chemical bond – Force holding atoms together.

Covalent bond – Bond by sharing of electrons.

Ionic bond – Electrostatic attraction between cation and anion.

Cation / anion – Positive ion / negative ion.

Polyatomic ion – Ion with atoms of two or more elements, e.g. SO_4^{2-} .

Single / double bond – One / two shared electron pairs.

Criss-cross method – Exchange valencies to write formula.

Molecular mass – Sum of atomic masses in a molecule.

Formula unit mass – Sum of atomic masses in one formula unit of an ionic compound.

Precipitate – Insoluble solid formed in a solution reaction.

Diagrams / Flowcharts

Covalent versus Ionic compounds

Covalent

- Sharing of electrons
- Low melting point
- Insoluble in water (mostly)
- Do not conduct

Ionic

- Transfer of electrons
- High melting point
- Soluble in water
- Conduct in solution or molten

Formation of NaCl

Na (2,8,1) loses 1 electron



Becomes Na^+ (2,8)




Cl (2,8,7) gains 1 electron



Becomes Cl^- (2,8,8); attraction gives NaCl

Chemical bonding

Chemical bonds



Writing a formula by criss-cross

Write symbols and charges



Cross the numbers



Simplify by common factor



Brackets for polyatomic ions

Formula writing practice

- Al^{3+} and O^{2-} gives Al_2O_3 . Ca^{2+} and Cl^- gives CaCl_2 . Mg^{2+} and OH^- gives $\text{Mg}(\text{OH})_2$. Al^{3+} and SO_4^{2-} gives $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. NH_4^+ and Cl^- gives NH_4Cl .

Remember

- Law of conservation of mass is verified only in a closed system (balloon).
Ionic compounds have formula unit mass, not molecular mass.

Revise, Reflect, Refine and Pause and Ponder (with Answers)

Q.1 Q1. Element A has 1 electron in the third shell; element B has 6 electrons in the second shell.

Ans. A is 2,8,1; B is 2,6. (i) A loses 1 electron. (ii) It forms a cation A^+ . (iii) B gains 2 electrons. (iv) It forms an anion B^{2-} . (v) Ionic bond. (vi) A_2B (like Na_2O).

Q.2 Q2. Element X has 6 electrons in the outer shell and forms a diatomic molecule.

Ans. (i) X needs 2 electrons for an octet, so two atoms share 2 electrons each. (ii) Covalent (double) bond. (iii) $X=X$, like $O=O$, with 2 shared pairs. (iv) Y with 2 electrons in the second shell has configuration 2,2 (beryllium); it is a metal that gives its 2 electrons to X, forming Y^{2+} and X^{2-} (compound YX , like BeO), so it is a transfer rather than sharing.

Q.3 Q3. Total positive charge 6^+ and negative charge 6^- : which combination?

Ans. (iii) 2 Fe^{3+} and 3 O^{2-} . ($2 \times 3 = 6^+$ and $3 \times 2 = 6^-$.)

Q.4 Q4. Correct the statements.

Ans. (i) False: elements are made of atoms (or molecules of the same atoms); compounds are made of molecules or ions of different elements. (ii) False: a molecule of a compound has atoms of different kinds. (iii) False: a nitrogen molecule N_2 contains two atoms. (iv) True.

Q.5 Q5. Formulae of aluminium nitrate, calcium oxide, ferric oxide.

Ans. (i) $Al(NO_3)_3$. (ii) CaO . (iii) Fe_2O_3 .

Q.6 Q6. Formulae from ion pairs.

Ans. (i) $CaBr_2$. (ii) $Al_2(CO_3)_3$. (iii) K_2SO_4 . (iv) NH_4Cl .

Q.7 Q7. Which of Fig. 9.18 represents the Cl^- ion?

Ans. Cl^- has 18 electrons: 2, 8, 8. Option (ii) has 2, 8, 8.

Q.8 Q8. Formula unit mass of NH_4NO_3 , H_3PO_4 , NaHCO_3 .

Ans. (i) NH_4NO_3 : $2(14) + 4(1) + 3(16) = 80 \text{ u}$. (ii) H_3PO_4 : $3(1) + 31 + 4(16) = 98 \text{ u}$. (iii) NaHCO_3 : $23 + 1 + 12 + 48 = 84 \text{ u}$.

Q.9 Q9. Formulae: $\text{Mg} + \text{N}$, $\text{Li} + \text{N}$, $\text{Na} + \text{S}$, $\text{Al} + \text{O}$.

Ans. (i) Mg_3N_2 . (ii) Li_3N . (iii) Na_2S . (iv) Al_2O_3 .

Q.10 Q10. Table 9.3.

Ans. NH_4^+ : NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$. Li^+ : LiNO_3 , Li_2SO_4 , Li_3PO_4 . Al^{3+} : $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, AlPO_4 . Cu^{2+} : $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, CuSO_4 , $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$.

Q.11 Q11. 5.3 g sodium carbonate + 6.0 g acetic acid give 2.2 g CO_2 , 0.9 g water, 8.2 g sodium acetate. Is the law valid?

Ans. Reactants: $5.3 + 6.0 = 11.3 \text{ g}$. Products: $2.2 + 0.9 + 8.2 = 11.3 \text{ g}$. Equal, so the law of conservation of mass is valid.

Q.12 Q12. Species with 11 protons, 12 neutrons, 10 electrons.

Ans. (i) Atomic number 11, mass number 23. (ii) A cation (11 protons exceed 10 electrons), charge +1. (iii) 2, 8. (iv) Sodium ion, Na^+ .

Q.13 Q13. A: 2, 8, 5 and B: 2, 8, 7.

Ans. (i) B (chlorine) is more reactive: it needs only 1 electron to complete its octet, while A (phosphorus) needs 3. (ii) Covalent: both are non-metals, so they share electrons. (iii) $\text{A} + 3 \text{ B}$ gives AB_3 (PCl_3).

Q.14 Q14. A: copper sulfate conducts in the molten state but not in the solid state. R: Ions are fixed in the lattice in the molten state, but free in solid.

Ans. (iii) A is true but R is false: in the solid state ions are fixed, in the molten state they are free to move.

Q.15 Q15. $^{27}_{13}\text{Al}$, $^{80}_{35}\text{Br}^-$ and $^{201}_{80}\text{Hg}^{2+}$ have 13, 35 and 80 protons. Electrons and neutrons?

Ans. $^{27}_{13}\text{Al}$: 13 electrons, 14 neutrons. $^{80}_{35}\text{Br}^-$: 36 electrons, 45 neutrons. $^{201}_{80}\text{Hg}^{2+}$: 78 electrons, 121 neutrons.

Q.16 PP1-2. Ethanol burnt in the open: is the law violated? 20 g hydrogen + 160 g oxygen?

Ans. No; the products (CO_2 and water vapour) escape into the air. Mass of water = $20 + 160 = 180$ g.

Q.17 PP3-6. 40 % S + 60 % O; CO with C : O = 3 : 4; mixtures; copper oxide 4:1 and 8:2.

Ans. S : O = 2 : 3, so 20 g S needs 30 g O. 9 g C needs 12 g O. A mixture has no fixed ratio, so the law does not apply. Both ratios simplify to 4 : 1, so the results justify the law.

Q.18 PP7. A: 2 g H + 16 g O gives 18 g water. R: atoms combine in a simple whole-number ratio by mass.

Ans. The assertion is true (1 : 8 by mass). The reason is not correct as stated, since atoms combine in a simple whole-number ratio by number, not by mass. Answer: (iii).

Q.19 PP8-11. Molecules and noble gas.

Ans. N_2 : each N shares 3 electrons, triple bond (three shared pairs). F_2 : each F (2, 7) shares 1 electron, F-F. CO_2 : C shares two pairs with each

O ($O=C=O$). H_2S : S shares one pair with each of two H. NH_3 : N shares one pair with each of 3 H. Neon (2,8) already has an octet, so it neither shares nor transfers electrons.

Q.20 PP12-15. Ions.

Ans. Oxygen forms O^{2-} . Chlorine becomes chloride Cl^- ; the Mg^{2+} ion and two Cl^- ions give $MgCl_2$. K and Ca lose 1 and 2 electrons to form K^+ and Ca^{2+} , giving KCl and $CaCl_2$. Na_2S : two Na each give 1 electron to one S which gains 2 (S^{2-}).

Q.21 PP16-18. Names and formulae.

Ans. CO_2 carbon dioxide; NO_2 nitrogen dioxide; SF_6 sulfur hexafluoride; PCl_3 phosphorus trichloride. $NaHCO_3$; SO_2 ; $FeCl_3$; Cu_2O . $Fe(OH)_3$; K_2CO_3 .

Q.22 PP19-24. Properties and masses.

Ans. Ionic bond. Metal M (2,8,2, magnesium): formula MO (MgO), ionic bond, aqueous solution conducts electricity. $HNO_3 = 1 + 14 + 48 = 63$ u; $CH_4 = 12 + 4 = 16$ u; $KCl = 39 + 35.5 = 74.5$ u; $Mg(OH)_2 = 24 + 2(16 + 1) = 58$ u.

Board Exam Questions (Important)

Q.1 State the law of conservation of mass and show it with an example.

Ans. Mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. $12\text{ g C} + 32\text{ g O} = 44\text{ g CO}_2$.

Q.2 State the law of constant proportions with an example.

Ans. A pure compound has elements in fixed mass ratio: water has $H : O = 1 : 8$ whatever the source.

Q.3 List Dalton's atomic theory postulates.

Ans. Atoms are indivisible; identical for an element; combine in simple whole-number ratios; not created or destroyed in reactions.

Q.4 Explain the formation of NaCl and MgCl_2 .

Ans. Na loses 1 electron (Na^+) and Cl gains it (Cl^-); Mg loses 2 electrons (Mg^{2+}) and two Cl each gain 1, giving MgCl_2 .

Q.5 Distinguish ionic and covalent compounds.


Ans. Ionic: electron transfer, high melting point, conduct in solution; covalent: sharing, low melting point, mostly non-conductors.

Q.6 Find the molecular mass of H_2O and CO_2 , and formula unit mass of Na_2O .

Ans. 18 u, 44 u, 62 u.

हिंदी संस्करण

पदार्थ की परमाण्विक नींव



अध्याय समीक्षा

- द्रव्यमान भौतिक परिवर्तनों (जमक का घुलना, कागज़ फाड़ना) और रासायनिक परिवर्तनों दोनों में संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप 9.2: सिरका + बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनते हैं; खुले फ्लास्क में गैस निकल जाने से पाठ्यांक घटता है, पर गुब्बारा लगाकर बंद निकाय में पहले और बाद के पाठ्यांक समान रहते हैं। क्रियाकलाप 9.3: सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं, कुल द्रव्यमान समान रहता है।
- द्रव्यमान संरक्षण का नियम (एंटोनी लवॉज़िए, 1789): रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न बनता है न नष्ट होता है; अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = उत्पादों का कुल द्रव्यमान। उदा. 9.1: $4.0 \text{ g CaCO}_3 + 2.92 \text{ g HCl} = 6.92 \text{ g}$; उत्पाद $1.76 + 0.72 + 4.44 = 6.92 \text{ g}$; नियम सत्य। उदा. 9.2: $12 \text{ g C} + 32 \text{ g O} \text{ से } 44 \text{ g CO}_2$; अतः $2.4 \text{ g C से } (44/12) \times 2.4 = 8.8 \text{ g CO}_2$
- स्थिर अनुपात का नियम (जोसेफ प्रूस्ट): किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं, चाहे स्रोत कोई हो। जल में हाइड्रोजन : ऑक्सीजन = 1 : 8 (9 g जल से 1 g H और 8 g O)। सिन्नाबार: पारा 86.22 % और गंधक 13.78 %। उदा. 9.3: NaCl में Na : Cl = 23 : 35.5, अतः 46 g Na के लिए $(35.5/23) \times 46 = 71 \text{ g Cl}$ । यह नियम यौगिकों पर लागू है, मिश्रणों पर नहीं।
- डाल्टन का परमाणु सिद्धांत (अभिधारणाएँ): समस्त पदार्थ अति सूक्ष्म परमाणुओं से बना है; परमाणु अविभाज्य हैं और रासायनिक अभिक्रिया में न बनते हैं न नष्ट होते हैं; एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान; भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न; परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं; यौगिक में परमाणुओं के प्रकार व संख्या स्थिर। यह दोनों नियम समझाता है। (बाद में समस्थानिकों और उपपरमाणुक कणों से कुछ अभिधारणाएँ संशोधित हुईं।)
- अणु एक से अधिक परमाणुओं की विद्युत उदासीन इकाई हैं जो स्वतंत्र रह सकती हैं और पदार्थ के गुण दर्शाती हैं (H_2 , Cl_2 , O_2 , HCl , H_2O)। हीलियम जैसे कुछ तत्व एकल परमाणु के रूप में रहते हैं। परमाणु अष्टक (हाइड्रोजन में द्वक) पाने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा या स्थानांतरित करते हैं; उन्हें बाँधने वाला बल रासायनिक आबंध है। जुड़ने पर निकाय की ऊर्जा घटती है।

- सहसंयोजी आबंध: इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनता है। H_2 : प्रत्येक H 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एकल आबंध $H-H$ । Cl_2 : एकल आबंध $Cl-Cl$ । O_2 : प्रत्येक O 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, द्विआबंध $O=O$ । HCl : H और Cl एक युग्म साझा करते हैं। H_2O : ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा करती है। नामकरण में उपसर्ग मोनो-, डाइ-, ट्राइ-, टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-: CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO_2 कार्बन डाइऑक्साइड, CS_2 कार्बन डाइसल्फाइड, PCl_3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, SF_6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, N_2O_4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, N_2O_5 डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। हाइड्रोजन से पहले उपसर्ग नहीं (H_2S हाइड्रोजन सल्फाइड)। जल और अमोनिया (NH_3) साधारण नाम से जाने जाते हैं।
- आयनिक आबंध: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनता है। 4 से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु उन्हें त्यागकर धनायन बनाता है; 4 से अधिक वाला ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। Na (2,8,1) 1 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na^+ (11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन); Cl (2,8,7) 1 ग्रहण कर Cl^- । विपरीत आयनों के बीच स्थिरवैद्युत आकर्षण बल आयनिक आबंध है ($NaCl$)। आयनिक यौगिक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनाते हैं (प्रत्येक Na^+ छह Cl^- से घिरा)। Mg से Mg^{2+} ; S 2 इलेक्ट्रॉन लेकर S^{2-} । धातुएँ धनायन, अधातुएँ ऋणायन बनाती हैं। नाम: पहले धनायन, फिर -ाइड वाला ऋणायन (सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड); बहुपरमाणुक आयनों के नाम सामान्यतः -ाइड पर नहीं समाप्त होते।
- सूत्र लिखना (संयोजकता/आवेश की क्रॉस-ओवर विधि): पहले धनायन लिखें, संख्याएँ आड़ी-तिरछी रखें, उभयनिष्ठ गुणनखंड से सरल करें, दो या अधिक बहुपरमाणुक आयन हों तो कोष्ठक लगाएँ। उदाहरण: HCl , H_2S , CCl_4 (सहसंयोजी); $CaCl_2$, Al_2O_3 , MgO (Mg_2O_2 नहीं), $CaCO_3$, $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$ ($AlOH_3$ नहीं), $Al_2(SO_4)_3$ । सामान्य आयन: Na^+ , Li^+ , K^+ , Ag^+ , Cu^+ , NH_4^+ , OH^- , NO_3^- , HCO_3^- , F^- , Cl^- , Br^- , I^- (संयोजकता 1); Ca^{2+} , Ba^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} , O^{2-} , S^{2-} , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} (2); Fe^{3+} , Al^{3+} (3)।
- गुण: आयनिक यौगिक ($NaCl$, $CuSO_4$) जल में घुलते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं; ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं (आयन स्थिर) पर जल में घोलने या पिघलाने पर चालन (आयन गतिशील); गलनांक और क्वथनांक उच्च। सहसंयोजी यौगिक (कपूर, नैफ्थलीन) जल में अघुलनशील, केरोसिन-पेट्रोल में घुलनशील, प्रायः अचालक, गलनांक-क्वथनांक निम्न; चीनी जल में घुलती है पर आयन नहीं बनाती, अतः चालन नहीं।

- सहसंयोजी यौगिक का आणविक द्रव्यमान = परमाणु द्रव्यमानों का योग ($H_2O = 18 u$, $CO_2 = 44 u$)। आयनिक यौगिक अणु नहीं बनाते; सूत्र इकाई द्रव्यमान: $Na_2O = 62 u$, $Ca(NO_3)_2 = 164 u$ । प्रयुक्त परमाणु द्रव्यमान: H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Mg 24, P 31, Cl 35.5, K 39, Ca 40।

मुख्य शब्दावली

द्रव्यमान संरक्षण नियम - अभिकारक का द्रव्यमान = उत्पाद का द्रव्यमान (लवॉज़िए)।

स्थिर अनुपात नियम - यौगिक में तत्वों का निश्चित द्रव्यमान अनुपात (प्रूस्ट)।

अणु - स्वतंत्र रह सकने वाला उदासीन परमाणु समूह।

रासायनिक आबंध - परमाणुओं को बाँधने वाला बल।

सहसंयोजी आबंध - इलेक्ट्रॉन साझा करने से बना आबंध।

आयनिक आबंध - धनायन और ऋणायन के बीच स्थिरवैद्युत आकर्षण।

धनायन / ऋणायन - धनावेशित / ऋणवेशित आयन।

बहुपरमाणुक आयन - दो या अधिक तत्वों के परमाणुओं वाला आयन, जैसे SO_4^{2-} ।

एकल / द्वि आबंध - एक / दो साझा इलेक्ट्रॉन युग्म।

क्रॉस-ओवर विधि - संयोजकता आपस में बदलकर सूत्र लिखना।

आणविक द्रव्यमान - अणु में परमाणु द्रव्यमानों का योग।

सूत्र इकाई द्रव्यमान - आयनिक यौगिक की एक सूत्र इकाई का द्रव्यमान।

अवक्षेप - विलयन में बना अघुलनशील ठोस।

आरेख / फ्लोचार्ट

सहसंयोजी बनाम आयनिक यौगिक


सहसंयोजी

- इलेक्ट्रॉन साझा
- निम्न गलनांक
- प्रायः जल में अघुलनशील
- विद्युत अचालक


आयनिक

- इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण
- उच्च गलनांक
- जल में घुलनशील
- घोल/पिघले में चालक


NaCl का बनना



रासायनिक आबंध



क्रॉस-ओवर से सूत्र



सूत्र लेखन अभ्यास

- Al^{3+} और O^{2-} से Al_2O_3 । Ca^{2+} और Cl^- से $CaCl_2$ । Mg^{2+} और OH^- से $Mg(OH)_2$ ।
 Al^{3+} और SO_4^{2-} से $Al_2(SO_4)_3$ । NH_4^+ और Cl^- से NH_4Cl ।

याद रखें

- द्रव्यमान संरक्षण केवल बंद निकाय (गुब्बारा) में सत्यापित होता है। आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान नहीं।

दोहराएँ, सोचें, सुधारें और रुकें-सोचें (उत्तर सहित)

प्र.1 प्र.1. तत्व A के तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और तत्व B के दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं।

उत्तर- $A = 2, 8, 1$; $B = 2, 6$ । (i) A 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। (ii) धनायन A^+ बनता है। (iii) B 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। (iv) ऋणायन B^{2-} बनता है। (v) आयनिक आबंध। (vi) A_2B (जैसे Na_2O)।

प्र.2 प्र.2. तत्व X के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वह द्विपरमाणुक अणु बनाता है।

उत्तर- (i) X को अष्टक हेतु 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दो परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। (ii) सहसंयोजी (द्वि) आबंध। (iii) $X=X$, जैसे $O=O$, 2 साझा युग्म। (iv) दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन वाला Y का विन्यास 2,2 (बेरिलियम) है; यह धातु है और 2 इलेक्ट्रॉन X को देकर Y^{2+} और X^{2-} बनाती है (यौगिक YX , जैसे BeO), अतः यहाँ साझा नहीं, स्थानांतरण होता है।

प्र.3 प्र.3. कुल धनावेश $6+$ और ऋणावेश $6-$ के लिए सही संयोजन?

उत्तर- (iii) 2 Fe^{3+} और 3 O^{2-} ($2 \times 3 = 6+$ और $3 \times 2 = 6-$)।

प्र.4 प्र.4. कथन सुधारिए।

उत्तर- (i) गलत: तत्व परमाणुओं (या समान परमाणुओं के अणुओं) से बने हैं; यौगिक भिन्न तत्वों के अणुओं या आयनों से। (ii) गलत: यौगिक के अणु में भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। (iii) गलत: नाइट्रोजन अणु N_2 में दो परमाणु हैं। (iv) सही।

प्र.5 प्र5. ऐलुमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के सूत्र।

उत्तर- (i) $Al(NO_3)_3$ (ii) CaO (iii) Fe_2O_3

प्र.6 प्र6. आयन युग्मों से बने यौगिकों के सूत्र।

उत्तर- (i) $CaBr_2$ (ii) $Al_2(CO_3)_3$ (iii) K_2SO_4 (iv) NH_4Cl

प्र.7 प्र7. चित्र 9.18 में कौन Cl^- आयन दर्शाता है?

उत्तर- Cl^- में 18 इलेक्ट्रॉन: 2, 8, 8। विकल्प (ii) में 2, 8, 8 हैं।

प्र.8 प्र8. NH_4NO_3 , H_3PO_4 , $NaHCO_3$ का सूत्र इकाई द्रव्यमान।

उत्तर- (i) NH_4NO_3 : $2(14) + 4(1) + 3(16) = 80$ u। (ii) H_3PO_4 : $3(1) + 31 + 4(16) = 98$ u। (iii) $NaHCO_3$: $23 + 1 + 12 + 48 = 84$ u।

प्र.9 प्र9. सूत्र: $Mg + N$, $Li + N$, $Na + S$, $Al + O$

उत्तर- (i) Mg_3N_2 (ii) Li_3N (iii) Na_2S (iv) Al_2O_3

प्र.10 प्र10. सारणी 9.3।

उत्तर- NH_4^+ : NH_4NO_3 , $(NH_4)_2SO_4$, $(NH_4)_3PO_4$ । Li^+ : $LiNO_3$, Li_2SO_4 , Li_3PO_4 । Al^{3+} : $Al(NO_3)_3$, $Al_2(SO_4)_3$, $AlPO_4$ । Cu^{2+} : $Cu(NO_3)_2$, $CuSO_4$, $Cu_3(PO_4)_2$ ।

प्र.11 प्र11. 5.3 g सोडियम कार्बोनेट + 6.0 g ऐसीटिक अम्ल से 2.2 g CO_2 , 0.9 g जल, 8.2 g सोडियम ऐसीटेट। क्या नियम सत्य है?

उत्तर- अभिकारक: $5.3 + 6.0 = 11.3$ g। उत्पाद: $2.2 + 0.9 + 8.2 = 11.3$ g। समान, अतः द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है।

प्र.12 प्र12. 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़।

उत्तर- (i) परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23। (ii) धनायन (11 प्रोटॉन > 10 इलेक्ट्रॉन), आवेश +1। (iii) 2, 8। (iv) सोडियम आयन, Na^+ ।

प्र.13 प्र13. A: 2, 8, 5 और B: 2, 8, 7।

उत्तर- (i) B (क्लोरीन) अधिक क्रियाशील: उसे अष्टक के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि A (फॉस्फोरस) को 3। (ii) सहसंयोजी: दोनों अधातु हैं, अतः इलेक्ट्रॉन साझा करते

हैं। (iii) AB_3 (PCl_3)।

प्र.14 प्र.14. A: कॉपर सल्फेट पिघली अवस्था में विद्युत चालक पर ठोस में नहीं। R: पिघली अवस्था में आयन जालक में स्थिर और ठोस में स्वतंत्र हैं।

उत्तर- (iii) A सत्य पर R असत्य: ठोस में आयन स्थिर, पिघली अवस्था में गतिशील होते हैं।

प्र.15 प्र.15. $27Al$, $80Br^-$ और $201Hg^{2+}$ में क्रमशः 13, 35, 80 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन?

उत्तर- $27Al$: 13 इलेक्ट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन। $80Br^-$: 36 इलेक्ट्रॉन, 45 न्यूट्रॉन। $201Hg^{2+}$: 78 इलेक्ट्रॉन, 121 न्यूट्रॉन।

प्र.16 रुकें-सोचें 1-2. खुले में एथेनॉल जलाने पर क्या नियम टूटता है? 20 g हाइड्रोजन + 160 g ऑक्सीजन?

उत्तर- नहीं; उत्पाद (CO_2 और जलवाष्प) हवा में चले जाते हैं। जल का द्रव्यमान = $20 + 160 = 180$ g।

प्र.17 रुकें-सोचें 3-6. 40 % S + 60 % O; CO में C : O = 3 : 4; मिश्रण; कॉपर ऑक्साइड 4:1 और 8:2।

उत्तर- S : O = 2 : 3, अतः 20 g S के लिए 30 g O। 9 g C के लिए 12 g O। मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं, अतः नियम लागू नहीं। दोनों अनुपात 4 : 1 हैं, अतः परिणाम नियम को सिद्ध करते हैं।

प्र.18 रुकें-सोचें 7. A: 2 g H + 16 g O से 18 g जल। R: परमाणु द्रव्यमान के सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं।

उत्तर- कथन A सत्य (द्रव्यमान से 1 : 8)। कारण जैसा लिखा है सही नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या के सरल पूर्ण अनुपात में जुड़ते हैं, द्रव्यमान के नहीं। उत्तर: (iii)।

प्र.19 रुकें-सोचें 8-11. अणु और उत्कृष्ट गैस।

उत्तर- N_2 : प्रत्येक N 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, त्रिआबंध। F_2 : प्रत्येक F (2,7)। इलेक्ट्रॉन साझा करता है, F-F। CO_2 : C प्रत्येक O के साथ दो युग्म साझा करता है ($O=C=O$)। H_2S : S दो H के साथ एक-एक युग्म साझा करता है। NH_3 : N तीन H के साथ एक-एक

युग्म साझा करता है। नियॉन (2,8) में अष्टक पूर्ण है, इसलिए वह न इलेक्ट्रॉन साझा करता है न स्थानांतरित।

प्र.20 रुकें-सोचें 12-15. आयन।

उत्तर- ऑक्सीजन O^{2-} बनाती है। क्लोरीन क्लोराइड Cl^- बनता है; Mg^{2+} और दो Cl^- से $MgCl_2$ । K और Ca क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागकर K^+ और Ca^{2+} बनाते हैं, जिनसे KCl और $CaCl_2$ । Na_2S : दो Na एक-एक इलेक्ट्रॉन एक S को देते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर S^{2-} बनता है।

प्र.21 रुकें-सोचें 16-18. नाम और सूत्र।

उत्तर- CO_2 कार्बन डाइऑक्साइड; NO_2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड; SF_6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड; PCl_3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। $NaHCO_3$; SO_2 ; $FeCl_3$; Cu_2O । $Fe(OH)_3$; K_2CO_3 ।

प्र.22 रुकें-सोचें 19-24. गुण और द्रव्यमान।

उत्तर- आयनिक आबंध। धातु M (2,8,2, मैग्नीशियम): सूत्र MO (MgO), आयनिक आबंध, जलीय विलयन विद्युत चालक। $HNO_3 = 1 + 14 + 48 = 63 \text{ u}$; $CH_4 = 12 + 4 = 16 \text{ u}$; $KCl = 39 + 35.5 = 74.5 \text{ u}$; $Mg(OH)_2 = 24 + 2(16 + 1) = 58 \text{ u}$ ।

बोर्ड परीक्षा प्रश्न (महत्वपूर्ण)

प्र.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर- रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। $12 \text{ g } C + 32 \text{ g } O = 44 \text{ g } CO_2$

प्र.2 स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर- शुद्ध यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं: जल में $H : O = 1 : 8$, स्रोत कोई भी हो।

प्र.3 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणाएँ लिखिए।

उत्तर- परमाणु अविभाज्य; एक तत्व के समान; सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते; अभिक्रिया में न बनते न नष्ट होते।

प्र.4 NaCl और MgCl_2 का बनना समझाइए।

उत्तर- Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na^+ और Cl उसे लेकर Cl^- ; Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Mg^{2+} और दो Cl प्रत्येक 1 लेकर, जिससे MgCl_2 ।

प्र.5 आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर।

उत्तर- आयनिक: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, उच्च गलनांक, विलयन में चालक; सहसंयोजी: साझा, निम्न गलनांक, प्रायः अचालक।

प्र.6 H_2O और CO_2 का आणविक द्रव्यमान तथा Na_2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान।

उत्तर- 18 u, 44 u, 62 u।

