

6.1 Why do runners in outer lanes start ahead?

In a 4×100 m race the outer lane runners start a little ahead. This gap is called the **stagger**. Reason: on a bend, the outer lane has a **bigger circle**, so its path is longer. To make the race fair, the organisers must know how to find the **length around a circle**. That is what this chapter teaches, plus **areas**.

Perimeter is the total length around a shape (an ant walking round the border). Square of side a : $4a$. Equilateral triangle: $3a$. Rectangle a by b : $2(a + b)$. The square formula is a special case of the rectangle one (put $b = a$).

6.2 The C/D ratio and π

Double the side of a square and its perimeter doubles. The ratio perimeter : side stays $4 : 1$ for every square ($3 : 1$ for equilateral triangles). For circles, the circumference C and diameter D also keep a fixed ratio, C/D , whatever the size. We call it π (pi).

Teacher's Note: Home activity: wind a thin thread 20 times round a cotton reel, measure its length L and the diameter D . Then $C/D = L \div (20 \times D)$. You will get a number between 3.1 and 3.2.

$$C = \pi D = 2\pi r \quad \pi \approx 22/7 \approx 3.14$$

History in short: Mesopotamians used $3\frac{1}{8}$. Archimedes trapped π between inscribed and circumscribed polygons: $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$. Zu Chongzhi gave $355/113$. Āryabhaṭa gave 3.1416 and called it **āsanna** (approximate).


Mādhava found the first exact formula: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$. The symbol π was made popular by Euler.

Think! Why does a hexagon inside a circle show $\pi > 3$? The hexagon has perimeter $6r$, and a circle of radius r is longer than that: $2\pi r > 6r$, so $\pi > 3$. A hexagon outside (touching) has side $2r/\sqrt{3}$, perimeter $4\sqrt{3}r$, so $2\pi r < 4\sqrt{3}r$ and $\pi < 2\sqrt{3} \approx 3.46$.

π is **irrational**: its decimal never ends and never repeats, and it cannot be written as a fraction of two integers. So $22/7$ is only **close**: $\pi \approx 22/7$ but $\pi \neq 22/7$. A better one is $355/113$. Trick to remember: "How I wish I could recollect pi" gives 3.141592 (count letters of each word).

6.3 Length of an arc

Semicircle: half of $2\pi r = \pi r$. Quarter circle: $\pi r/2$. For an arc making angle θ° at the centre, take that fraction of the whole circle:



Arc AB, angle θ at centre O

$$\text{arc length} = 2\pi r \times \theta/360$$

Racing track. A 400 m track has two straights of 84.39 m and two semicircle bends. An athlete running 0.3 m from the inner edge on the bends ($r = 36.8$ m): $2 \times 84.39 + 2\pi \times 36.8 = 168.78 + 231.22 = 400 \text{ m} \checkmark$. Each outer lane is 1.22 m wider, so one bend is longer by $\pi \times 1.22 \approx 3.83 \text{ m}$. That


is the stagger. It depends only on the **lane width**, not on the track size, so a 200 m school track needs the **same** stagger.

Perimeter puzzles (solved)

Example 1: Two circles of radius r , each through the other centre. Perimeter of the shape?

Step 1: Triangle ABC has all sides r , so it is equilateral and $\angle CAB = 60^\circ$. So $\angle CAD = 120^\circ$, and each outer red arc is 240° , which is $2/3$ of a circle.


Step 2: Total = $2 \times (2/3) \times 2\pi r = 8\pi r/3$.



Example 2: One big semicircle a or three small semicircles b, c, d. Which path is longer?

Step 1: Lengths: $\pi a'$ and $\pi(b' + c' + d')$. Since $PQ = 2a' = 2b' + 2c' + 2d'$, we get $a' = b' + c' + d'$.

Step 2: So the paths are **equal**.



Path a (top) or path b + c + d (bottom)?

Exercise Set 6.1 (solved, $\pi = 22/7$)

Q.1 Perimeter 44 cm. Radius?

Ans. $2 \times 22/7 \times r = 44$, so $r = 44 \times 7 \div 44 = 7$ cm.

Q.2 Circumference for $r = 7, 10, 12$ cm (3 significant figures)

Ans. (i) $2 \times 22/7 \times 7 = 44.0$ cm.

(ii) $2 \times 22/7 \times 10 = 62.857$, so 62.9 cm.

(iii) $2 \times 22/7 \times 12 = 75.43$, so 75.4 cm.

Q.3 Arc length: (i) $r = 3.5$ cm, 60° (ii) $r = 6.3$ m, 120°

Ans. (i) $2 \times 22/7 \times 3.5 \times 60/360 = 22 \times 1/6 = 3.67$ cm.

(ii) $2 \times 22/7 \times 6.3 \times 120/360 = 39.6 \div 3 = 13.2$ m.

Q.4 Perimeter of a sector, $r = 14$ cm, angle 75°

Ans. Arc = $2 \times 22/7 \times 14 \times 75/360 = 88 \times 5/24 = 18.33$ cm.

Add two radii: $18.33 + 14 + 14 = 46.33$ cm.

Q.5 Perimeters of the shapes in Fig. 6.14 (arcs are halves or quarters)

Ans. (i) Rectangle 80 m with two semicircles of diameter 60 m at the ends: $2 \times 80 + 60\pi = 160 + 188.57 = 348.57$ m.

(ii) Outer semicircle ($d = 12$) + inner semicircle ($d = 8$) + two base pieces of 2 cm each: $6\pi + 4\pi + 4 = 10\pi + 4 = 35.43$ cm.

(iii) Square of side 10 with a semicircle on each side: $4 \times (\pi \times 5) = 20\pi$
 $= 62.86 \text{ cm}.$

(iv) Equilateral triangle side 12 with a semicircle on each side: $3 \times (\pi \times 6) = 18\pi = 56.57 \text{ cm}.$

(v) Each small square has side 14 cm. Four quarter circles of radius 14 make 1 full circle $= 28\pi$, and four semicircle bumps of diameter 14 add $4 \times 7\pi = 28\pi$. Total $= 56\pi = 176 \text{ cm}.$

(vi) Big semicircle $d = 28$: $14\pi = 44$. Four small semicircles $d = 7$: $4 \times 3.5\pi = 44$. Total $88 \text{ cm}.$

(vii) Right triangle 6, 8, 10 with a semicircle on every side: $\pi(5 + 4 + 3) = 12\pi = 37.71 \text{ cm}.$

(viii) Big semicircle $d = 12$: 6π , plus three small $d = 4$: $3 \times 2\pi = 6\pi$. Total $12\pi = 37.71 \text{ cm}.$

(ix) Big semicircle ($r = 10$) 10π , plus two small ones ($r = 5$) $5\pi + 5\pi$. Total $20\pi = 62.86 \text{ cm}.$

Q.6 Tyre diameter 56 cm

Ans. (i) One revolution = circumference $= 22/7 \times 56 = 176 \text{ cm}.$

(ii) 10 km = 1,000,000 cm. Revolutions $= 1,000,000 \div 176 \approx 5682.$

Q.7 Total perimeter of all petals (Fig. 6.15)

Ans. (i) The petals are made from 4 semicircles of radius 7 (square side 14), so the total $= 4 \times 7\pi = 28\pi = 88 \text{ cm}.$


(ii) Hexagon side 42. Each petal has two 60° arcs of radius 42, each arc is $42\pi/3$. 6 petals $\times 2$ arcs $\times 14\pi = 168\pi = 528 \text{ cm}.$

Q.8 Perimeters in ratio 5 : 4. Ratio of radii?

Ans. Perimeter $= 2\pi r$, so perimeter is proportional to r . Radii are also in the ratio 5 : 4.

6.4 Areas you already know

Rectangle: ab . Square: a^2 . Parallelogram: $\text{base} \times \text{height} = bh$ (cut a triangle off one side and stick it on the other side to get a rectangle). Triangle: two copies make a parallelogram, so area = $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$. A parallelogram with fixed sides can be squeezed, so its area is **not** fixed by its sides alone.



Median AD cuts the triangle into two equal areas

Theorem: a median divides a triangle into two triangles of equal area.

Reason: triangles ABD and ACD have equal bases ($BD = DC$) and the same height h , so each has area $\frac{1}{2} \times (BC/2) \times h$. They look different but have equal area.

Think! Rectangles with perimeter 40: there are **infinitely many**. The largest area is the **square** $10 \times 10 = 100$. There is **no smallest** area (a very thin rectangle has area close to 0).

6.5 Heron's formula

If the sides are a, b, c , the **semi-perimeter** is $s = (a + b + c)/2$. Then:

$$\text{Area} = \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$$

Test 1: Equilateral triangle, side a

Step 1: $s = 3a/2$. $\text{Area} = \sqrt{[(3a/2)(a/2)(a/2)(a/2)]} = \sqrt{(3a^4/16)} = (\sqrt{3/4})a^2$. Same as $\frac{1}{2} \times a \times (\sqrt{3/2})a$ ✓.

Test 2: Triangle 3, 4, 5

Step 1: $s = 6$. $\text{Area} = \sqrt{(6 \times 3 \times 2 \times 1)} = \sqrt{36} = 6$. And $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$ ✓.

Two more formulas: $\text{Area} = abc/(4R)$ (R = circumradius) and $\text{Area} = r(a + b + c)/2$ (r = inradius).

Brahmagupta's formula for a **cyclic** 4-gon with sides a, b, c, d and $s = (a + b + c + d)/2$:

$$\text{Area} = \sqrt{[(s - a)(s - b)(s - c)(s - d)]}$$

Teacher's Note: Why cyclic? A rhombus with side 3 can have areas 9, 8.01 or 5.41 depending on its angle. So four sides alone do not fix the area. Put $d = 0$ and Brahmagupta's formula becomes Heron's formula. This is called a **generalisation**; Heron's is the **special case**.

Squaring a rectangle (Baudhāyana): to make a square of area ab , use $((a+b)/2)^2 - ((a-b)/2)^2 = ab$. The square side is the leg of a right triangle with hypotenuse $(a+b)/2$ and other leg $(a-b)/2$.

Exercise Set 6.2 (solved)

Q.1 Area of triangle ADE (rectangle ABCD, $AD = 8$, $DC = 10$, E on BC)

Ans. Base $AD = 8$ cm and E is 10 cm from AD , so area = $\frac{1}{2} \times 8 \times 10 = 40$ cm^2 .

Q.2 Trapezium with parallel sides 40, 20 and equal legs 26

Ans. Half the difference of parallel sides = $(40 - 20)/2 = 10$. Height = $\sqrt{(26^2 - 10^2)} = \sqrt{576} = 24$.

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times (40 + 20) \times 24 = 720 \text{ cm}^2.$$

Q.3 Sides 8 and 11, perimeter 32

Ans. Third side = $32 - 19 = 13$. $s = 16$. Area = $\sqrt{(16 \times 8 \times 5 \times 3)} = \sqrt{1920} = 8\sqrt{30} \approx 43.8 \text{ cm}^2$.

Q.4 Sides in ratio 3 : 5 : 7, perimeter 300 m

Ans. Sides = 60, 100, 140 m. $s = 150$. Area = $\sqrt{(150 \times 90 \times 50 \times 10)} = \sqrt{6,750,000} = 1500\sqrt{3} \approx 2598 \text{ m}^2$.

Q.5 Rhombus diagonals d and $2d$, area 128

Ans. Area = $\frac{1}{2} \times d \times 2d = d^2 = 128$, so $d = \sqrt{128} = 8\sqrt{2} \approx 11.3 \text{ cm}$ (shorter diagonal).

Q.6 P, Q on side AB of parallelogram ABCD. Area(PCD) : Area(QCD)?

Ans. Both triangles have the same base CD and the same height (distance between parallel lines AB and CD). Ratio = 1 : 1.

Q.7 O on diagonal PR of parallelogram PQRS. Area(PSO) = Area(PQO)

Ans. Diagonal PR passes through the midpoint of QS, so Q and S are at equal distance from line PR. Triangles PSO and PQO share base PO and have equal heights, so equal area.

Q.8 Midpoints of a 4-gon joined: area of the parallelogram = $\frac{1}{2}$ area of 4-gon

Ans. In 4-gon ABCD, take midpoints P (AB), Q (BC), R (CD), S (DA). PQ is parallel to AC and half of it, so triangle BPQ has sides half of triangle BAC, hence $\frac{1}{4}$ of its area. Same for DRS and ADC. Together: $\frac{1}{4}$ of the whole 4-gon.

Triangles APS and CQR also give $\frac{1}{4}$ together. The four corner triangles = $\frac{1}{2}$ of the 4-gon. So the middle parallelogram = $\frac{1}{2}$.

Q.9 Median AD , P on AD . $\text{Area}(ABP) = \text{Area}(ACP)$

Ans. Median: $\text{Area}(ABD) = \text{Area}(ACD)$. In triangle PBC , PD is a median, so $\text{Area}(PBD) = \text{Area}(PCD)$. Subtract: $\text{Area}(ABP) = \text{Area}(ACP)$.

Q.10 P inside square $ABCD$. Ratio of red ($PAB + PCD$) to green ($PBC + PDA$)

Ans. Heights from P to AB and CD add up to the side s , so red = $\frac{1}{2} \times s \times s = s^2/2$. Same for green. Ratio = $1:1$.


Q.11 D midpoint of AB , $CQ \parallel PD$. $\text{Area}(BPQ) = \frac{1}{2} \text{Area}(ABC)$

Ans. Triangles DPQ and DPC have the same base DP and lie between parallels PD and CQ , so $\text{Area}(DPQ) = \text{Area}(DPC)$.


$\text{Area}(BPQ) = \text{Area}(BPD) + \text{Area}(DPQ) = \text{Area}(BPD) + \text{Area}(DPC) = \text{Area}(BDC) = \frac{1}{2} \text{Area}(ABC)$ (CD is a median).

6.6 Area of a circle

Cut a circle into many thin slices and place them alternately. They form almost a **parallelogram** with base = half the circumference = πr and height = r .



8 slices



πr (half circumference)

Slices of a circle make a parallelogram

$$\text{Area of circle} = \pi r \times r = \pi r^2$$

Archimedes said: area = $\frac{1}{2} \times \text{circumference} \times \text{radius} = \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r = \pi r^2$.

Early values: Babylonians $A \approx C^2/12$; Egyptians $A \approx (8d/9)^2$.

Sector (like a pizza slice, angle θ°): area = $\pi r^2 \times \theta/360$. Semicircle = $\pi r^2/2$, quadrant = $\pi r^2/4$. A **segment** is the region between an arc and its chord.

$$\text{sector area} = \pi r^2 \times \theta/360$$

Exercise Set 6.3 (solved)

Q.1 Sector, $r = 7$, angle 60°

Ans. $22/7 \times 49 \times 60/360 = 154/6 = 25.67 \text{ cm}^2$.

Q.2 Quadrant of a circle with circumference 44 cm

Ans. $2 \times 22/7 \times r = 44$, so $r = 7$. Quadrant = $1/4 \times 22/7 \times 49 = 38.5 \text{ cm}^2$.

Q.3 Minute hand 7 cm, area swept in 10 minutes

Ans. 10 minutes = 60° (since 60 min = 360°). Area = $22/7 \times 49 \times 60/360 = 25.67 \text{ cm}^2$.

Q.4 $r = 10$, chord subtends 90° ($\pi = 3.14$)

Ans. (i) Minor sector = $3.14 \times 100 \times 90/360 = 78.5 \text{ cm}^2$.

(ii) Major sector = $3.14 \times 100 \times 270/360 = 235.5 \text{ cm}^2$.

Q.5 $r = 15$, chord subtends 60° ($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)

Ans. Sector = $3.14 \times 225 \times 60/360 = 117.75$. Triangle OAB is equilateral with side 15: area = $(\sqrt{3}/4) \times 225 = 97.31$.

Minor segment = $117.75 - 97.31 = 20.44 \text{ cm}^2$.

Circle = $3.14 \times 225 = 706.5$. **Major segment** = $706.5 - 20.44 = 686.06 \text{ cm}^2$.

Q.6 Two wipers, blade 28 cm, angle 120° each

Ans. One wiper: $22/7 \times 784 \times 120/360 = 821.33$. Two wipers: **1642.67 cm²**.

Q.7 Minor segment for 60° chord = $r^2(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$

Ans. Sector = $\pi r^2/6$. Triangle OAB is equilateral: $(\sqrt{3}/4)r^2$. Difference = $\pi r^2(1/6 - \sqrt{3}/(4\pi)) = r^2(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$.

Q.8 Equilateral triangle in a circle of radius r . Area ratio?

Ans. Side = $r\sqrt{3}$, so area = $(\sqrt{3}/4) \times 3r^2 = 3\sqrt{3}r^2/4$. Ratio = $3\sqrt{3}r^2/4 \div \pi r^2 = 3\sqrt{3}/(4\pi) \approx 0.413$.

Q.9 Square in a circle

Ans. Diagonal = $2r$, so side² = $2r^2$ = area. Ratio = $2r^2/\pi r^2 = 2/\pi \approx 0.637$.

Q.10 Hexagon in a circle

Ans. Six equilateral triangles of side r : $6 \times (\sqrt{3}/4)r^2 = 3\sqrt{3}r^2/2$. Ratio = $3\sqrt{3}/(2\pi) \approx 0.827$. This is exactly twice the answer to Q8, because the hexagon has twice the area of the inscribed equilateral triangle.

End-of-Chapter Exercises (solved)


Q.1 Area models of identities

Ans. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ is a big square of side $a + b$ cut in 4 pieces.


For $(a + b)(a - b)$: take a square $a \times a$ and remove the corner $b \times b$.

Cut the L-shape in two rectangles and place them side by side to form $(a + b)$ by $(a - b)$.

For $(a + b + c)^2$: a square of side $a + b + c$ cut in a 3×3 grid. The pieces are a^2 , b^2 , c^2 and two each of ab , bc , ca .



$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$



$$(a+b+c)^2 \text{ as 9 pieces}$$

Q.2 Isosceles, perimeter 40, equal sides 15

Ans. Base = $40 - 30 = 10$. Height = $\sqrt{(225 - 25)} = 10\sqrt{2}$. Area = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10\sqrt{2} = 50\sqrt{2} \approx 70.7 \text{ cm}^2$ (Heron: $s = 20$, $\sqrt{(20 \times 5 \times 5 \times 10)} = \sqrt{5000}$ ✓).

Q.3 Isosceles, base 10, area 60

Ans. $\frac{1}{2} \times 10 \times h = 60$, so $h = 12$. Equal side = $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13 \text{ cm}$.

Q.4 Right triangle, area 54, one leg 12

Ans. Other leg = $2 \times 54 \div 12 = 9$. Hypotenuse = $\sqrt{(144 + 81)} = 15$.

Perimeter = $12 + 9 + 15 = 36 \text{ cm}$.

Q.5 Sides 2 : 3 : 4, perimeter 45

Ans. Sides 10, 15, 20. $s = 22.5$. Area = $\sqrt{(22.5 \times 12.5 \times 7.5 \times 2.5)} = 75\sqrt{15/4} \approx 72.6 \text{ cm}^2$.

Q.6 Triangle 7, 24, 25: two ways

Ans. Right triangle ($49 + 576 = 625$): $\frac{1}{2} \times 7 \times 24 = 84 \text{ cm}^2$.

Heron: $s = 28$, $\sqrt{(28 \times 21 \times 4 \times 3)} = \sqrt{7056} = 84 \text{ cm}^2 \checkmark$.

Q.7 Wheel $d = 60 \text{ cm}$, 100 rotations

Ans. Circumference $= 22/7 \times 60 = 188.57 \text{ cm}$. Distance $= 100 \times 188.57 = 18857 \text{ cm} \approx 188.6 \text{ m}$.

Q.8 Quadrant of circle with circumference 66 cm

Ans. $r = 66 \times 7/44 = 10.5$. Area $= \frac{1}{4} \times 22/7 \times 10.5^2 = 86.625 \text{ cm}^2$.

Q.9 Car wheel $r = 28 \text{ cm}$

Ans. One turn $= 2 \times 22/7 \times 28 = 176 \text{ cm}$. $1 \text{ km} = 100,000 \text{ cm}$, so turns $= 100,000 \div 176 \approx 568$.

Q.10 Same area and same perimeter: congruent?

Ans. Sides a, b with $a + b = p$ and $ab = A$. a and b are the roots of $x^2 - px + A = 0$, so the pair $\{a, b\}$ is fixed. **Yes**, the rectangles are congruent.

Q.11 Trapezium area from a parallelogram

Ans. Take a second copy of the trapezium, turn it upside down, and join it. You get a parallelogram of base $(a + b)$ and height h . The trapezium is half of it: $\frac{1}{2}(a + b)h$.

Q.12 Trapezium as two triangles

Ans. A diagonal makes two triangles, with bases a and b and the same height h . Area $= \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(a + b)h$.

Q.13 Two identical trapeziums make a parallelogram

Ans. Rotate the second trapezium by 180° and attach it along a leg.

Parallelogram base $= a + b$, height $= h$, area $= (a + b)h$. One trapezium

$$= \frac{1}{2}(a + b)h.$$

Q.14 Kite area = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

Ans. (i) Algebra: diagonals meet at right angles; the long diagonal d_1 is cut into x and y with $x + y = d_1$. Two triangles: $\frac{1}{2} \times d_2 \times x + \frac{1}{2} \times d_2 \times y = \frac{1}{2} d_1 d_2$.

(ii) Geometry: draw a rectangle $d_1 \times d_2$ around the kite. The kite is exactly half of this rectangle.

Q.15 Scaling

Ans. (i) Sides $2a, 2b$: area $4ab$, four times. 4 copies of ABCD fit (2×2). ✓

(ii) Triangle with sides doubled: area $\times 4$. Joining midpoints cuts it into 4 congruent small triangles, so 4 copies fit ✓.

(iii) Sides tripled: area $\times 9$. Trisect the sides and cut into 9 congruent triangles, so 9 copies fit ✓.

Q.16 Fraction shaded

Ans. Fig 6.43: P is the midpoint of one side, Q and S trisect another. The shaded 4-gon is $\frac{1}{2}$ of the triangle.

Fig 6.44: side 2, the lines are $2x + y = 2$ and $2x + y = 4$ etc. Inner square vertices are $(0.4, 1.2), (1.2, 1.6), \dots$ so its side² = 0.8. Area 0.8 out of 4 = $\frac{1}{5}$.




Fig. 6.43: shaded part = $1/4$




Fig. 6.44: shaded part = $1/5$

Q.17 Circles in a rectangle

Ans. Fig 6.45: 3 circles of radius r in a $6r \times 2r$ rectangle: $3\pi r^2 \div 12r^2 = \pi/4$

Fig 6.46: 4 circles in $8r \times 2r$: $4\pi r^2 \div 16r^2 = \pi/4$.




Fig. 6.45: 3 circles

Q.18 n circles in a row

Ans. Rectangle = $2nr \times 2r = 4nr^2$. Circles = $n\pi r^2$. Fraction = $\pi/4 \approx 78.5\%$
for 10, 20, 50 or any n . n cancels, so the claim is proved for every n .


Q.19 Nine rectangles, big rectangle area 72

Ans. Let each small rectangle be l by w . Top row: 4 lying l , bottom row: 5 standing w . Same length: $4l = 5w$. Area: $9lw = 72$, $lw = 8$.
 $l = 5w/4$, so $5w^2/4 = 8$, $w^2 = 32/5$, $w = 4\sqrt{10}/5$, $l = \sqrt{10}$.
Perimeter = $2(l + w) = 2 \times 1.8\sqrt{10} = 18\sqrt{10}/5 \approx 11.38 \text{ cm}$.

Q.20 Trisection triangles are equal

Ans. Blue and red triangles share the apex A and have bases $BP = QC$ (equal, since the base is trisected) and the same height. So their areas are equal.

To rearrange: cut the blue triangle by the line joining the midpoints of its two slant sides. The small top triangle, turned 180° , joins the trapezium to make a parallelogram. Cut a right-angled triangle off and move it to make a rectangle of base BP and height $h/2$. Do the same steps backwards to get the red triangle.




Q20: bases $BP = QC$, same height

Q.21 Quarter circle and two semicircles: $A = B$

Ans. Square side a . Quarter circle (centre at the vertex) $= \pi a^2/4$. Two semicircles on the sides: $2 \times \pi a^2/8 = \pi a^2/4$. They are equal.

Quarter circle = (two semicircles together) - $A + B$. Since the totals are equal, $A = B$.




Q21: area $A =$ area B

Q.22 Four-petal flower, square side 2

Ans. Each petal is two quarter circles of radius 1: perimeter π . **Perimeter** = $4\pi \approx 12.57$.


Four semicircles total area 2π cover the square (area 4) once, and the petals twice. Petal area = $2\pi - 4$. **Area** = $2\pi - 4 \approx 2.28$ sq. units.



Q22: four-petal flower

Q.23 Two concentric circles, $BC = l$ touches the small one

Ans. A is the midpoint of BC , so $AB = l/2$. Right triangle OAB : $R^2 = r^2 + (l/2)^2$. Ring area $= \pi(R^2 - r^2) = \pi \times l^2/4 = \frac{1}{4}\pi l^2$.




Q23: ring between two circles

Q.24 Semicircles on the sides of a right triangle

Ans. Semicircle areas: $\pi a^2/8, \pi b^2/8, \pi c^2/8$. Since $a^2 + b^2 = c^2$, the two on the legs add up to the one on the hypotenuse: $A + B = C$.

Q.25 Area of the two-circle lens

Ans. Triangle ABC is equilateral, so each arc is 120° . Lens $= 2 \times (\text{sector } 120^\circ - \text{triangle}) = 2(\pi r^2/3 - \sqrt{3}r^2/4) = r^2(2\pi/3 - \sqrt{3}/2) \approx 1.23r^2$.




Q25: the shaded lens

Q.26 Rectangle = $2(A + C)(B + C)/C$

Ans. Let the rectangle be W by H . The point P is at distance x from the left and y from the bottom. $A = \frac{1}{2}x(H - y)$, $B = \frac{1}{2}(W - x)y$, $C = \frac{1}{2}(W - x)(H - y)$.

$(A + C) = \frac{1}{2}(H - y)W$ and $(B + C) = \frac{1}{2}(W - x)H$. Product = $\frac{1}{4}WH(W - x)(H - y) = \frac{1}{4}WH \times 2C = WHC/2$.


So $WH = 2(A + C)(B + C)/C$.



Q26: triangles A, B, C in a rectangle

Q.27 The two shaded regions are equal

Ans. Radius r , $AB = r\sqrt{2}$. Semicircle on AB has radius $r\sqrt{2}/2$, area = $\frac{1}{2} \times \pi \times r^2/2 = \pi r^2/4$. Quarter circle OAB has area $\pi r^2/4$. They are equal. Lune = semicircle - segment; triangle OAB = quarter circle - the same segment. Hence **lune = triangle** (a lune of Hippocrates).




Q27: blue lune = orange triangle

Teacher's Note: Chapter summary: $C = 2\pi r$. Arc = $2\pi r \times \theta/360$. Triangle = $\frac{1}{2}bh$. Heron: $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$. Circle = πr^2 . Sector = $\pi r^2 \times \theta/360$. Brahmagupta: $\sqrt{[(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)]}$ for a cyclic 4-gon. π is irrational.



हिंदी संस्करण

स्थान की माप: परिमाप और क्षेत्रफल



6.1 बाहरी लेन के धावक आगे से क्यों शुरू करते हैं?

4 × 100 मी की रिले दौड़ में बाहरी लेन के धावक थोड़ा आगे से दौड़ना शुरू करते हैं। इस फ़ासले को **स्टैंगर** कहते हैं। कारण: मोड़ पर बाहरी लेन का **वृत्त बड़ा** होता है, इसलिए उसका रास्ता लंबा होता है। दौड़ को न्यायपूर्ण बनाने के लिए **वृत्त की लंबाई** निकालना आना चाहिए। यही इस अध्याय में सीखेंगे, साथ में **क्षेत्रफल**।

परिमाप किसी आकृति की सीमा की कुल लंबाई है (जैसे चींटी किनारे-किनारे घूमे)। वर्ग (भुजा a): **4a**। समबाहु त्रिभुज: **3a**। आयत $a \times b$: **2(a + b)**। वर्ग का सूत्र आयत के सूत्र का विशेष रूप है ($b = a$ रखो)।

6.2 C/D अनुपात और π

वर्ग की भुजा दुगुनी करो तो परिमाप भी दुगुना होता है। परिमाप : भुजा का अनुपात हर वर्ग में **4 : 1** रहता है (समबाहु त्रिभुज में 3 : 1)। वृत्त में भी परिधि C और व्यास D का अनुपात **C/D** हर आकार में एक ही रहता है। इसे **π (पाई)** कहते हैं।

शिक्षक की बात: घर पर प्रयोग: सूत की रील पर पतला धागा 20 बार कसकर लपेटो, धागे की लंबाई L और रील का व्यास D नापो। तब $C/D = L \div (20 \times D)$ । उत्तर 3.1 और 3.2 के बीच आएगा।

$$C = \pi D = 2\pi r \quad \pi \approx 22/7 \approx 3.14$$


इतिहास संक्षेप में: मेसोपोटामिया ने $3\frac{1}{8}$ लिया। आर्किमिडीज़ ने अंदर और बाहर के बहुभुजों के बीच π को पकड़ा: $3 \frac{10}{71} < \pi < 3 \frac{1}{71}$ । लू चोंगली ने 355/113 दिया। **आर्यभट** ने 3.1416 दिया और उसे **आसन्न** (लगभग) कहा। **माधव** ने π का पहला सटीक सूत्र खोजा: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$ । π चिह्न को यूलर ने लोकप्रिय बनाया।

सोचो! वृत्त के अंदर षट्भुज से $\pi > 3$ कैसे दिखता है? षट्भुज का परिमाप $6r$ है और वृत्त उससे लंबा है: $2\pi r > 6r$, इसलिए **$\pi > 3$** । बाहर वाले षट्भुज की भुजा $2r/\sqrt{3}$, परिमाप $4\sqrt{3}r$, तो $2\pi r < 4\sqrt{3}r$, यानी **$\pi < 2\sqrt{3} \approx 3.46$** ।

π अपरिमेय है: इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता और दोहराता नहीं, और इसे दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए 22/7 केवल **पास** है: $\pi \approx 22/7$ लेकिन $\pi \neq 22/7$ । बेहतर मान 355/113 है।

6.3 चाप की लंबाई

अर्धवृत्त: $2\pi r$ का आधा = πr । चौथाई वृत्त: $\pi r/2$ । केंद्र पर θ° कोण बनाने वाले चाप के लिए पूरे वृत्त का उतना ही भाग लो:



$$\text{चाप की लंबाई} = 2\pi r \times \theta/360$$


दौड़ का ट्रैक। 400 मी ट्रैक में दो सीधे भाग 84.39 मी और दो अर्धवृत्ताकार मोड़ हैं। भीतरी किनारे से 0.3 मी हटकर दौड़ने वाला ($r = 36.8$ मी): $2 \times 84.39 + 2\pi \times 36.8 = 168.78 + 231.22 = 400$ मी ✓। हर बाहरी लेन 1.22 मी चौड़ी है, इसलिए एक मोड़ $\pi \times 1.22 \approx 3.83$ मी लंबा हो जाता है। यही स्टेजर है। यह केवल **लेन की चौड़ाई** पर निर्भर है, ट्रैक के आकार पर नहीं, इसलिए 200 मी वाले स्कूल ट्रैक में **उतना ही** स्टेजर चाहिए।

परिमाण की पहेलियाँ (हल सहित)

उदाहरण 1: त्रिज्या r के दो वृत्त, हर एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है। आकृति का परिमाण?

चरण 1: त्रिभुज ABC की सब भुजाएँ r हैं, इसलिए समबाहु है और $\angle CAB = 60^\circ$ । इसलिए $\angle CAD = 120^\circ$, और हर बाहरी लाल चाप 240° है, यानी वृत्त का $2/3$ ।

चरण 2: कुल = $2 \times (2/3) \times 2\pi r = 8\pi r/3$ ।




दो वृत्त, हर एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है

उदाहरण 2: एक बड़ा अर्धवृत्त a या तीन छोटे अर्धवृत्त b, c, d । कौन-सा रास्ता लंबा है?

चरण 1: लंबाइयाँ: $\pi a'$ और $\pi(b' + c' + d')$ । $PQ = 2a' = 2b' + 2c' + 2d'$, इसलिए $a' = b' + c' + d'$ ।

चरण 2: इसलिए दोनों रास्ते बराबर हैं।



रास्ता a (ऊपर) या $b + c + d$ (नीचे)?

प्रश्नावली 6.1 (हल सहित, $\pi = 22/7$)

प्र.1 परिमाण 44 सेमी। त्रिज्या?

उत्तर- $2 \times 22/7 \times r = 44$, इसलिए $r = 44 \times 7 \div 44 = 7$ सेमी।

प्र.2 $r = 7, 10, 12$ सेमी की परिधि (3 सार्थक अंकों तक)

उत्तर- (i) $2 \times 22/7 \times 7 = 44.0$ सेमी।

(ii) $2 \times 22/7 \times 10 = 62.857$, यानी 62.9 सेमी।

(iii) $2 \times 22/7 \times 12 = 75.43$, यानी **75.4 सेमी** ।

प्र.3 चाप की लंबाई: (i) $r = 3.5$ सेमी, 60° (ii) $r = 6.3$ मी, 120°

उत्तर- (i) $2 \times 22/7 \times 3.5 \times 60/360 = 22 \times 1/6 = 3.67$ सेमी ।

(ii) $2 \times 22/7 \times 6.3 \times 120/360 = 39.6 \div 3 = 13.2$ मी ।

प्र.4 त्रिज्यखंड का परिमाप, $r = 14$ सेमी, कोण 75°

उत्तर- चाप $= 2 \times 22/7 \times 14 \times 75/360 = 88 \times 5/24 = 18.33$ सेमी।

दो त्रिज्याएँ जोड़ो: $18.33 + 14 + 14 = 46.33$ सेमी ।

प्र.5 चित्र 6.14 की आकृतियों के परिमाप (चाप आधे या चौथाई वृत्त के हैं)

उत्तर- (i) आयत 80 मी, दोनों सिरों पर व्यास 60 मी के अर्धवृत्त: $2 \times 80 + 60\pi = 160 + 188.57 = 348.57$ मी ।

(ii) बाहरी अर्धवृत्त (व्यास 12) + भीतरी अर्धवृत्त (व्यास 8) + आधार के दो टुकड़े 2-2 सेमी: $6\pi + 4\pi + 4 = 10\pi + 4 = 35.43$ सेमी ।

(iii) भुजा 10 के वर्ग की हर भुजा पर अर्धवृत्त: $4 \times (\pi \times 5) = 20\pi = 62.86$ सेमी ।

(iv) भुजा 12 के समबाहु त्रिभुज की हर भुजा पर अर्धवृत्त: $3 \times (\pi \times 6) = 18\pi = 56.57$ सेमी ।

(v) हर छोटे वर्ग की भुजा 14 सेमी। त्रिज्या 14 के चार चौथाई वृत्त मिलकर 1 पूरा वृत्त $= 28\pi$, और व्यास 14 के चार अर्धवृत्त $4 \times 7\pi = 28\pi$ । कुल $= 56\pi = 176$ सेमी ।

(vi) बड़ा अर्धवृत्त $d = 28$: $14\pi = 44$ । चार छोटे अर्धवृत्त $d = 7$: $4 \times 3.5\pi = 44$ । कुल **88 सेमी** ।

(vii) समकोण त्रिभुज 6, 8, 10, हर भुजा पर अर्धवृत्त: $\pi(5 + 4 + 3) = 12\pi = 37.71$ सेमी ।

(viii) बड़ा अर्धवृत्त $d = 12$: 6π , और तीन छोटे $d = 4$: $3 \times 2\pi = 6\pi$ । कुल $12\pi = 37.71$ सेमी ।

(ix) बड़ा अर्धवृत्त ($r = 10$) 10π , और दो छोटे ($r = 5$) $5\pi + 5\pi$ । कुल $20\pi = 62.86$ सेमी ।

प्र.6 टायर का व्यास 56 सेमी

उत्तर- (i) एक चक्कर = परिधि = $22/7 \times 56 = 176$ सेमी ।

(ii) 10 किमी = 1,000,000 सेमी। चक्कर = $1,000,000 \div 176 \approx 5682$ ।

प्र.7 चित्र 6.15 में सब पंखुड़ियों का कुल परिमाण

उत्तर- (i) पंखुड़ियाँ त्रिज्या 7 के 4 अर्धवृत्तों से बनी हैं (वर्ग की भुजा 14), कुल = $4 \times 7\pi = 28\pi = 88$ सेमी ।


(ii) षट्भुज की भुजा 42। हर पंखुड़ी में त्रिज्या 42 के दो 60° चाप हैं, हर चाप $42\pi/3$ । 6 पंखुड़ियाँ $\times 2$ चाप $\times 14\pi = 168\pi = 528$ सेमी ।

प्र.8 दो वृत्तों के परिमाणों का अनुपात 5 : 4। त्रिज्याओं का अनुपात?

उत्तर- परिमाण = $2\pi r$, यानी परिमाण r के समानुपाती हैं। त्रिज्याओं का अनुपात भी **5 : 4** हैं।

6.4 क्षेत्रफल जो आप पहले से जानते हैं

आयत: ab । वर्ग: a^2 । समांतर चतुर्भुज: **आधार $\times$ ऊँचाई = bh** (एक तरफ से त्रिभुज काटकर दूसरी तरफ चिपकाओ तो आयत बन जाता है)। त्रिभुज: दो प्रतियाँ मिलकर समांतर चतुर्भुज बनाती हैं, इसलिए क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ **आधार $\times$ ऊँचाई** । समांतर चतुर्भुज की भुजाएँ वही रखकर उसे दबाया जा सकता है, इसलिए केवल भुजाओं से उसका क्षेत्रफल तय **नहीं** होता।



ध्येका AD त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बाँट

प्रमेय: माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बाँटती है।

कारण: त्रिभुज ABD और ACD के आधार बराबर हैं ($BD = DC$) और ऊँचाई h एक ही है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल $\frac{1}{2} \times (BC/2) \times h$ । देखने में अलग हैं पर क्षेत्रफल बराबर।

सोचो! परिमाप 40 वाले आयत: **अनंत** हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल **वर्ग** $10 \times 10 = 100$ का है। **सबसे छोटा** क्षेत्रफल नहीं होता (बहुत पतले आयत का क्षेत्रफल 0 के पास चला जाता है)।

6.5 हेरन का सूत्र

भुजाएँ a, b, c हों तो **अर्ध-परिमाप** $s = (a + b + c)/2$ । तब:

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$$

जाँच 1: समबाहु त्रिभुज, भुजा a

चरण 1: $s = 3a/2$ । क्षेत्रफल $= \sqrt{[(3a/2)(a/2)(a/2)(a/2)]} = \sqrt{(3a^4/16)} = (\sqrt{3}/4)a^2$ ।
यह $\frac{1}{2} \times a \times (\sqrt{3}/2)a$ के बराबर है ✓।

जाँच 2: त्रिभुज 3, 4, 5

चरण 1: $s = 6$ । क्षेत्रफल $= \sqrt{(6 \times 3 \times 2 \times 1)} = \sqrt{36} = 6$ । और $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$ ✓।

दो और सूत्र: क्षेत्रफल $= abc/(4R)$ (R = परित्रिज्या) और क्षेत्रफल $= r(a + b + c)/2$ (r = अंतत्रिज्या)।

ब्रह्मगुप्त का सूत्र चक्रीय चतुर्भुज के लिए, भुजाएँ a, b, c, d और $s = (a + b + c + d)/2$:

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)]}$$

शिक्षक की बात: चक्रीय क्यों? भुजा 3 वाला समचतुर्भुज कोण के अनुसार 9, 8.01 या 5.41 क्षेत्रफल का हो सकता है। यानी केवल चार भुजाओं से क्षेत्रफल तय नहीं होता। $d = 0$ रखने पर ब्रह्मगुप्त का सूत्र हेरन का सूत्र बन जाता है। इसे **सामान्यीकरण** कहते हैं; हेरन का सूत्र **विशेष रूप** है।

आयत का वर्गीकरण (बोधायन): क्षेत्रफल ab का वर्ग बनाने के लिए $((a+b)/2)^2 -$

$((a-b)/2)^2 = ab$ का प्रयोग करो। वर्ग की भुजा उस समकोण त्रिभुज की एक भुजा है जिसका कर्ण $(a+b)/2$ और दूसरी भुजा $(a-b)/2$ है।

प्रश्नावली 6.2 (हल सहित)

प्र.1 त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल (आयत ABCD, AD = 8, DC = 10, E, BC पर)

उत्तर- आधार AD = 8 सेमी और E, AD से 10 सेमी दूर है, इसलिए क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times 8 \times 10 = 40$ सेमी²।

प्र.2 समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजाएँ 40, 20 और बराबर भुजाएँ 26

उत्तर- समांतर भुजाओं के अंतर का आधा = $(40 - 20)/2 = 10$ । ऊँचाई = $\sqrt{(26^2 - 10^2)} = \sqrt{576} = 24$ ।

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times (40 + 20) \times 24 = 720$ सेमी²।

प्र.3 भुजाएँ 8 और 11, परिमाप 32

उत्तर- तीसरी भुजा = $32 - 19 = 13$ । $s = 16$ । क्षेत्रफल = $\sqrt{(16 \times 8 \times 5 \times 3)} = \sqrt{1920} = 8\sqrt{30} \approx 43.8$ सेमी²।

प्र.4 भुजाओं का अनुपात 3 : 5 : 7, परिमाप 300 मी

उत्तर- भुजाएँ = 60, 100, 140 मी। $s = 150$ । क्षेत्रफल = $\sqrt{(150 \times 90 \times 50 \times 10)} = \sqrt{6,750,000} = 1500\sqrt{3} \approx 2598$ मी²।

प्र.5 समचतुर्भुज के विकर्ण d और $2d$, क्षेत्रफल 128

उत्तर- क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times d \times 2d = d^2 = 128$, इसलिए $d = \sqrt{128} = 8\sqrt{2} \approx 11.3$ सेमी (छोटा विकर्ण)।

प्र.6 समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB पर P, Q। क्षेत्रफल(PCD) : क्षेत्रफल(QCD)?

उत्तर- दोनों त्रिभुजों का आधार CD एक ही है और ऊँचाई भी एक (समांतर रेखाओं AB और CD के बीच की दूरी)। अनुपात = 1 : 1।

प्र.7 समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR पर O। क्षेत्रफल(PSO) = क्षेत्रफल(PQO)

उत्तर- विकर्ण PR, QS के मध्य बिंदु से जाता है, इसलिए Q और S रेखा PR से **बराबर दूरी** पर हैं। त्रिभुज PSO और PQO का आधार PO उभयनिष्ठ है और ऊँचाइयाँ बराबर, इसलिए **क्षेत्रफल बराबर**।

प्र.8 चतुर्भुज के मध्य बिंदु जोड़ने पर बना समांतर चतुर्भुज = चतुर्भुज का आधा

उत्तर- चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु P, Q, R, S लो। PQ, AC के समांतर और उसका आधा है, इसलिए त्रिभुज BPQ की भुजाएँ त्रिभुज BAC की आधी हैं, यानी क्षेत्रफल $\frac{1}{4}$ । इसी तरह DRS और ADC। दोनों मिलकर पूरे का $\frac{1}{4}$ । त्रिभुज APS और CQR भी मिलकर $\frac{1}{4}$ । चारों कोने के त्रिभुज = पूरे का $\frac{1}{2}$ । इसलिए बीच का समांतर चतुर्भुज = $\frac{1}{2}$ ।

प्र.9 माधिका AD, AD पर P। क्षेत्रफल(ABP) = क्षेत्रफल(ACP)

उत्तर- माधिका से क्षेत्रफल(ABD) = क्षेत्रफल(ACD)। त्रिभुज PBC में PD माधिका है, इसलिए क्षेत्रफल(PBD) = क्षेत्रफल(PCD)। घटाओ: **क्षेत्रफल(ABP) = क्षेत्रफल(ACP)**।

प्र.10 वर्ग ABCD के अंदर P। लाल (PAB + PCD) और हरे (PBC + PDA) का अनुपात


उत्तर- P से AB और CD तक की ऊँचाइयों का योग भुजा s है, इसलिए लाल = $\frac{1}{2} \times s \times s = s^2/2$ । हरा भी यही। अनुपात = 1 : 1।

प्र.11 D, AB का मध्य बिंदु, CQ || PD। क्षेत्रफल(BPQ) = $\frac{1}{2}$ क्षेत्रफल(ABC)

उत्तर- त्रिभुज DPQ और DPC का आधार DP एक है और ये समांतर रेखाओं PD और CQ के बीच हैं, इसलिए क्षेत्रफल(DPQ) = क्षेत्रफल(DPC)।
क्षेत्रफल(BPQ) = क्षेत्रफल(BPD) + क्षेत्रफल(DPQ) = क्षेत्रफल(BPD) + क्षेत्रफल(DPC)
= क्षेत्रफल(BDC) = $\frac{1}{2}$ क्षेत्रफल(ABC) (CD माधिका है)।

6.6 वृत्त का क्षेत्रफल

वृत्त को बहुत पतली कतरनों में काटो और बारी-बारी से रखो। लगभग **समांतर चतुर्भुज** बनता है जिसका आधार = आधी परिधि = πr और ऊँचाई = r ।



8 slices



πr (half circumference)

वृत्त की कतरनों से समांतर चतुर्भुज

$$\text{वृत्त का क्षेत्रफल} = \pi r \times r = \pi r^2$$

आर्किमिडीज़ ने कहा: क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{परिधि} \times \text{त्रिज्या} = \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r = \pi r^2$ । पुराने मान: बेबीलोन $A \approx C^2/12$; मिस्र $A \approx (8d/9)^2$ ।

त्रिज्यखंड (पिज्जा के टुकड़े जैसा, कोण θ°): क्षेत्रफल = $\pi r^2 \times \theta/360$ । अर्धवृत्त = $\pi r^2/2$, चतुर्थांश = $\pi r^2/4$ । **वृत्तखंड** चाप और उसकी जीवा के बीच का भाग है।

$$\text{त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल} = \pi r^2 \times \theta/360$$

प्रश्नावली 6.3 (हल सहित)

प्र.1 त्रिज्यखंड, $r = 7$, कोण 60°

उत्तर- $22/7 \times 49 \times 60/360 = 154/6 = 25.67 \text{ सेमी}^2$ ।

प्र.2 परिधि 44 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश

उत्तर- $2 \times 22/7 \times r = 44$, इसलिए $r = 7$ । चतुर्थांश = $\frac{1}{4} \times 22/7 \times 49 = 38.5 \text{ सेमी}^2$ ।

प्र.3 मिनट की सुई 7 सेमी, 10 मिनट में घेरा क्षेत्रफल

उत्तर- 10 मिनट = 60° (क्योंकि 60 मिनट = 360°)। क्षेत्रफल = $22/7 \times 49 \times 60/360 = 25.67 \text{ सेमी}^2$ ।

प्र.4 $r = 10$, जीवा 90° अंतरित करती है ($\pi = 3.14$)

उत्तर- (i) लघु त्रिज्यखंड = $3.14 \times 100 \times 90/360 = 78.5$ सेमी² ।

(ii) दीर्घ त्रिज्यखंड = $3.14 \times 100 \times 270/360 = 235.5$ सेमी² ।

प्र.5 $r = 15$, जीवा 60° अंतरित करती है ($\pi = 3.14$, $\sqrt{3} = 1.73$)

उत्तर- त्रिज्यखंड = $3.14 \times 225 \times 60/360 = 117.75$ । त्रिभुज OAB समबाहु है, भुजा 15: क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4) \times 225 = 97.31$

लघु वृत्तखंड = $117.75 - 97.31 = 20.44$ सेमी² ।

वृत्त = $3.14 \times 225 = 706.5$ । दीर्घ वृत्तखंड = $706.5 - 20.44 = 686.06$ सेमी² ।

प्र.6 दो वाइपर, फल 28 सेमी, हर एक 120° घूमता है

उत्तर- एक वाइपर: $22/7 \times 784 \times 120/360 = 821.33$ । दो वाइपर: **1642.67** सेमी² ।

प्र.7 60° की जीवा का लघु वृत्तखंड = $r^2(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$

उत्तर- त्रिज्यखंड = $\pi r^2/6$ । त्रिभुज OAB समबाहु: $(\sqrt{3}/4)r^2$ । अंतर = $\pi r^2(1/6 - \sqrt{3}/(4\pi)) = r^2(\pi/6 - \sqrt{3}/4)$ ।

प्र.8 त्रिज्या r के वृत्त में समबाहु त्रिभुज। क्षेत्रफलों का अनुपात?

उत्तर- भुजा = $r\sqrt{3}$, इसलिए क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4) \times 3r^2 = 3\sqrt{3}r^2/4$ । अनुपात = $3\sqrt{3}r^2/4 \div \pi r^2 = 3\sqrt{3}/(4\pi) \approx 0.413$ ।

प्र.9 वृत्त में वर्ग

उत्तर- विकर्ण = $2r$, इसलिए भुजा² = $2r^2$ = क्षेत्रफल। अनुपात = $2r^2/\pi r^2 = 2/\pi \approx 0.637$ ।

प्र.10 वृत्त में षट्भुज


उत्तर- भुजा r के छह समबाहु त्रिभुज: $6 \times (\sqrt{3}/4)r^2 = 3\sqrt{3}r^2/2$ । अनुपात = **$3\sqrt{3}/(2\pi) \approx 0.827$** । यह प्रश्न 8 के उत्तर का ठीक दुगुना है, क्योंकि षट्भुज का क्षेत्रफल अंतस्थ समबाहु त्रिभुज का दुगुना होता है।

अध्याय के अंत की प्रश्नावली (हल सहित)


प्र.1 सर्वसमिकाओं के क्षेत्रफल मॉडल

उत्तर- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ भुजा $a + b$ का बड़ा वर्ग है जो 4 टुकड़ों में कटा है।

$(a + b)(a - b)$ के लिए: $a \times a$ का वर्ग लो और कोने से $b \times b$ हटा दो। L-आकार को दो आयतों में काटकर अगल-बगल रखो, तो $(a + b) \times (a - b)$ का आयत बनता है।
 $(a + b + c)^2$ के लिए: भुजा $a + b + c$ का वर्ग 3×3 जाल में कटा है। टुकड़े a^2 , b^2 , c^2 और ab , bc , ca दो-दो।



$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$



$(a+b+c)^2$ के 9 टुकड़े

प्र.2 समद्विबाहु, परिमाण 40, बराबर भुजाएँ 15

उत्तर- आधार = $40 - 30 = 10$ ऊँचाई = $\sqrt{(225 - 25)} = 10\sqrt{2}$ क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10\sqrt{2} = 50\sqrt{2} \approx 70.7$ सेमी² (हेरन: $s = 20$, $\sqrt{(20 \times 5 \times 5 \times 10)} = \sqrt{5000} \checkmark$)।

प्र.3 समद्विबाहु, आधार 10, क्षेत्रफल 60

उत्तर- $\frac{1}{2} \times 10 \times h = 60$, इसलिए $h = 12$ । बराबर भुजा = $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$ सेमी ।

प्र.4 समकोण त्रिभुज, क्षेत्रफल 54, एक भुजा 12

उत्तर- दूसरी भुजा = $2 \times 54 \div 12 = 9$ । कर्ण = $\sqrt{(144 + 81)} = 15$ । परिमाण = $12 + 9 + 15 = 36$ सेमी ।

प्र.5 भुजाएँ 2 : 3 : 4, परिमाण 45

उत्तर- भुजाएँ 10, 15, 20। $s = 22.5$ । क्षेत्रफल = $\sqrt{(22.5 \times 12.5 \times 7.5 \times 2.5)} = 75\sqrt{15}/4 \approx 72.6$ सेमी²।

प्र.6 त्रिभुज 7, 24, 25: दो तरीकों से

उत्तर- समकोण त्रिभुज ($49 + 576 = 625$): $\frac{1}{2} \times 7 \times 24 = 84$ सेमी²।

हेरन: $s = 28$, $\sqrt{(28 \times 21 \times 4 \times 3)} = \sqrt{7056} = 84$ सेमी² ✓।

प्र.7 साइकिल के पहिये का व्यास 60 सेमी, 100 चक्कर

उत्तर- परिधि = $22/7 \times 60 = 188.57$ सेमी। दूरी = $100 \times 188.57 = 18857$ सेमी ≈ 188.6 मी।

प्र.8 परिधि 66 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश

उत्तर- $r = 66 \times 7/44 = 10.5$ । क्षेत्रफल = $\frac{1}{4} \times 22/7 \times 10.5^2 = 86.625$ सेमी²।

प्र.9 कार के पहिये की त्रिज्या 28 सेमी

उत्तर- एक चक्कर = $2 \times 22/7 \times 28 = 176$ सेमी। 1 किमी = 100,000 सेमी, इसलिए चक्कर = $100,000 \div 176 \approx 568$ ।

प्र.10 क्षेत्रफल और परिमाण दोनों बराबर: क्या आयत सर्वांगसम हैं?

उत्तर- भुजाएँ a, b जहाँ $a + b = p$ और $ab = A$ । a और b समीकरण $x^2 - px + A = 0$ के मूल हैं, इसलिए जोड़ी $\{a, b\}$ तय है। हाँ, आयत सर्वांगसम हैं।

प्र.11 समांतर चतुर्भुज से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल

उत्तर- समलंब की दूसरी प्रति उलटकर जोड़ दो। आधार $(a + b)$ और ऊँचाई h का समांतर चतुर्भुज बनता है। समलंब उसका आधा है: $\frac{1}{2}(a + b)h$ ।

प्र.12 समलंब को दो त्रिभुजों में बाँटकर

उत्तर- विकर्ण से दो त्रिभुज बनते हैं, आधार a और b , ऊँचाई h वही। क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(a + b)h$ ।

प्र.13 दो समान समलंब से समांतर चतुर्भुज

उत्तर- दूसरे समलंब को 180° घुमाकर एक भुजा से जोड़ दो। समांतर चतुर्भुज का आधार = $a + b$, ऊँचाई = h , क्षेत्रफल = $(a + b)h$ । एक समलंब = $\frac{1}{2}(a + b)h$ ।

प्र.14 पतंग का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

उत्तर- (i) बीजगणित: विकर्ण समकोण पर कटते हैं; लंबा विकर्ण d_1 भागों x और y में कटता है, $x + y = d_1$ । दो त्रिभुज: $\frac{1}{2} \times d_2 \times x + \frac{1}{2} \times d_2 \times y = \frac{1}{2} d_1 d_2$ ।
(ii) ज्यामिति: पतंग के चारों ओर $d_1 \times d_2$ का आयत बनाओ। पतंग ठीक उस आयत की आधी है।


प्र.15 पैमाना बदलना

उत्तर- (i) भुजाएँ $2a, 2b$: क्षेत्रफल $4ab$, चार गुना। ABCD की 4 प्रतियाँ आ जाती हैं (2×2) ✓।
(ii) त्रिभुज की भुजाएँ दुगुनी: क्षेत्रफल $\times 4$ । मध्य बिंदु जोड़ने पर 4 सर्वांगसम छोटे त्रिभुज बनते हैं, इसलिए 4 प्रतियाँ आ जाती हैं ✓।
(iii) भुजाएँ तिगुनी: क्षेत्रफल $\times 9$ । भुजाओं को तीन बराबर भागों में बाँटकर 9 सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं, इसलिए 9 प्रतियाँ आ जाती हैं ✓।


प्र.16 रंगा हुआ भाग कितना?

उत्तर- **चित्र 6.43:** P एक भुजा का मध्य बिंदु है, Q और S दूसरी भुजा के त्रिभाजन बिंदु। रंगा चतुर्भुज त्रिभुज का $\frac{1}{2}$ है।

चित्र 6.44: भुजा 2, रेखाएँ $2x + y = 2$ और $2x + y = 4$ आदि। भीतरी वर्ग के शीर्ष $(0.4, 1.2), (1.2, 1.6), \dots$ हैं, इसलिए भुजा² = 0.8। 4 में से 0.8 = $\frac{1}{5}$ ।



चित्र 6.43: रंगा भाग = $1/2$




चित्र 6.44: रंगा भाग = $1/5$

प्र.17 आयत में वृत्त

उत्तर- चित्र 6.45: $6r \times 2r$ के आयत में त्रिज्या r के 3 वृत्त: $3\pi r^2 \div 12r^2 = \pi/4$ ।

चित्र 6.46: $8r \times 2r$ में 4 वृत्त: $4\pi r^2 \div 16r^2 = \pi/4$ ।



चित्र 6.45: 3 वृत्त

प्र.18 पंक्ति में n वृत्त


उत्तर- आयत = $2nr \times 2r = 4nr^2$ । वृत्त = $n\pi r^2$ । भिन्न = $\pi/4 \approx 78.5\%$ चाहे 10, 20, 50 या कोई भी n हो। n कट जाता है, इसलिए हर n के लिए सिद्ध हो गया।

प्र.19 नौ आयत, बड़े आयत का क्षेत्रफल 72

उत्तर- हर छोटे आयत की भुजाएँ l और w मानो। ऊपर की पंक्ति में 4 लेटे हुए l , नीचे 5 खड़े w । लंबाई बराबर: $4l = 5w$ । क्षेत्रफल: $9lw = 72$, $lw = 8$ ।
 $l = 5w/4$, तो $5w^2/4 = 8$, $w^2 = 32/5$, $w = 4\sqrt{10}/5$, $l = \sqrt{10}$ ।
 परिमाण = $2(l + w) = 2 \times 1.8\sqrt{10} = 18\sqrt{10}/5 \approx 11.38$ सेमी।

प्र.20 त्रिभाजन वाले त्रिभुज बराबर हैं


उत्तर- नीले और लाल त्रिभुज का शीर्ष A एक है, आधार $BP = QC$ (आधार के तीन बराबर भाग) और ऊँचाई एक। इसलिए क्षेत्रफल **बराबर** हैं।
 दोबारा जोड़ने के लिए: नीले त्रिभुज को उसकी दो तिरछी भुजाओं के मध्य बिंदु जोड़ने वाली रेखा से काटो। ऊपर का छोटा त्रिभुज 180° घुमाकर समलंब से जोड़ो, समांतर चतुर्भुज बनेगा। उसमें से एक समकोण त्रिभुज काटकर खिसकाओ तो आधार BP और ऊँचाई $h/2$ का आयत बनता है। यही कदम उलटे करके लाल त्रिभुज बन जाएगा।



प्र.20: आधार $BP = QC$, ऊँचाई समान

प्र.21 चौथाई वृत्त और दो अर्धवृत्त: $A = B$


उत्तर- वर्ग की भुजा a । चौथाई वृत्त (केंद्र शीर्ष पर) = $\pi a^2/4$ । भुजाओं पर दो अर्धवृत्त: $2 \times \pi a^2/8 = \pi a^2/4$ । दोनों बराबर हैं।
 चौथाई वृत्त = (दोनों अर्धवृत्त) - A + B । कुल बराबर हैं, इसलिए **$A = B$** ।



प्र 21: क्षेत्रफल $A =$ क्षेत्रफल B

प्र.22 चार पंखुड़ी का फूल, वर्ग की भुजा 2


उत्तर- हर पंखुड़ी त्रिज्या 1 के दो चौथाई वृत्तों से बनी है: परिमाण π । परिमाण $= 4\pi \approx 12.57$ ।
चार अर्धवृत्तों का कुल क्षेत्रफल 2π वर्ग (क्षेत्रफल 4) को एक बार और पंखुड़ियों को दो बार ढकता है। पंखुड़ी क्षेत्रफल $= 2\pi - 4$ । क्षेत्रफल $= 2\pi - 4 \approx 2.28$ वर्ग इकाई।



प्र 22: चार पंखुड़ियों वाला फूल

प्र.23 दो संकेन्द्रित वृत्त, $BC = 1$ छोटे वृत्त को छूती है

उत्तर- A , BC का मध्य बिंदु है, इसलिए $AB = 1/2$ । समकोण त्रिभुज OAB : $R^2 = r^2 + (1/2)^2$ ।
छल्ले का क्षेत्रफल $= \pi(R^2 - r^2) = \pi \times 1^2/4 = \frac{1}{4} \pi 1^2$ ।




प्र.23: दो वृत्तों के बीच का छल्ला

प्र.24 समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर अर्धवृत्त

उत्तर- अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल: $\pi a^2/8$, $\pi b^2/8$, $\pi c^2/8$ । $a^2 + b^2 = c^2$ है, इसलिए दोनों भुजाओं वाले अर्धवृत्त मिलकर कर्ण वाले अर्धवृत्त के बराबर हैं: $A + B = C$ ।

प्र.25 दो वृत्तों के लेंस का क्षेत्रफल

उत्तर- त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए हर चाप 120° का है। लेंस = $2 \times (120^\circ \text{ का त्रिज्यखंड - त्रिभुज}) = 2(\pi r^2/3 - \sqrt{3}r^2/4) = r^2(2\pi/3 - \sqrt{3}/2) \approx 1.23r^2$ ।




प्र.25: रंगा हुआ लेंस

प्र.26 आयत = $2(A + C)(B + C)/C$

उत्तर- आयत $w \times h$ मानो। बिंदु P बाएँ से x और नीचे से y दूरी पर है। $A = \frac{1}{2}x(h - y)$, $B = \frac{1}{2}(w - x)y$, $C = \frac{1}{2}(w - x)(h - y)$ ।

$$(A + C) = \frac{1}{2}(H - y)W \text{ और } (B + C) = \frac{1}{2}(W - x)H \mid \text{ गुणनफल} = \frac{1}{4}WH(W - x)(H - y) = \frac{1}{4}WH \times 2C = WHC/2 \mid$$


$$\text{इसलिए } WH = \frac{2(A + C)(B + C)}{C} \mid$$



प्र 26: आयत में त्रिभुज A, B, C

प्र.27 दोनों रंगे क्षेत्र बराबर हैं

उत्तर- त्रिज्या r , $AB = r\sqrt{2}$ । AB पर अर्धवृत्त की त्रिज्या $r\sqrt{2}/2$, क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times \pi \times r^2/2 = \pi r^2/4$ । चौथाई वृत्त OAB का क्षेत्रफल $\pi r^2/4$ । दोनों बराबर।
चंद्रक = अर्धवृत्त - वृत्तखंड; त्रिभुज OAB = चौथाई वृत्त - वही वृत्तखंड। इसलिए **चंद्रक = त्रिभुज** (हिप्पोक्रेटीज़ का चंद्रक)।



प्र 27: नीला चंद्रक = नारंगी त्रिभुज

शिक्षक की बात: अध्याय सार: $C = 2\pi r$ । चाप $= 2\pi r \times \theta/360$ । त्रिभुज $= \frac{1}{2}bh$ । हेरन: $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ । वृत्त $= \pi r^2$ । त्रिज्यखंड $= \pi r^2 \times \theta/360$ । ब्रह्मगुप्त: चक्रीय चतुर्भुज के लिए $\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ । π अपरिमेय है।